Рассмотрена и одобрена
на заседании Ветбиофармсовета
«17» 04 2012г, протокол № 62

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата Энровет 10%-й раствор для орального применения

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Энровет 10%-й раствор для орального применения (Solutio Enroveti 10% pro adhibitionis per os).

1.2. В 1 $см^3$ препарата содержится 100 мг энрофлоксацина

1.3. Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачную бесцветную или светло-желтого цвета жидкость.

1.4. Выпускают препарат по 50, 100, 500 и 1000 мл в емкостях полиэтиленовых с завинчивающейся крышкой.. Хранят с предосторожностью по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25°С. Срок годности – 2 года.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Энровет 10%-й раствор для орального применения относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Escherichia, Haemophilus, Klebsiella, Pasteurella, Pseudomonas, Bordetella, Campylobacter, Erysipelotrix, Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacillus, Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, а также Mycoplasma spp.

2.2. Резистентность бактерий к энровету 10%-му развивается относительно медленно, так как механизм противомикробного действия энрофлоксацина связан с ингибированием активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в бактериальной клетке.

2.3. Препарат хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает в органы и ткани организма. Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 1-2 часа после введения препарата и сохраняется на протяжении 6 часов, а терапевтическая концентрация – на протяжении 24 часов.

2.4. Выделяется из организма, преимущественно, в неизменном виде с мочой и с желчью.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1. Энровет 10%-й раствор для орального применения применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, бронхопневмонии, энтеритах и других заболеваниях у телят, ягнят, свиней и птиц, вызванных микроорганизмами чувствительными, к фторхинолонам, а также при бордетеллезе, энзоотической пневмонии и синдроме мастит-метрит-агалактии.

3.2. Применяют препарат один раз в сутки вместе с водой или кормом в течение 3-5 дней в следующих дозах:

Вид животных	Доза		
	мг/кг	мл/10 кг	мл/1 л воды
Телята	2,5 - 5	0,25 – 0,5	-
Ягнята	2,5 - 5	0,25 – 0,5	-
Поросята	2,5 - 5	0,25 – 0,5	-
Бройлеры, индейки	5,0 - 10	-	0,5

3.3. Противопоказания: Не допускается применение препарата курам-несушкам. Противопоказано его одновременное назначение с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, хлорамфеникола, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными средствами и теофилином.

3.4. Побочного действия в рекомендуемых дозах не наблюдается.

3.5. Убой на мясо животных, которым применяли Энровет 10%-й раствор для орального применения, разрешается не ранее чем через 14, а птицы – 11 суток после последнего дня применения препарата.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ.

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется а Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Производственно-снабженческое унитарное предприятие «ГРУППА – СТС»
Инструкция разработана сотрудником РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Кучинским М.П. и УП «Группа СТС».

Ветбиофармсовет при Департаменте ветеринарного и продовольственного контроля МСХ И П РБ
ОДОБРЕНО
Председатель
Секретарь
Эксперт
«17» 04 2012 г., протокол № 62